

DMX - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA

Av. Carlos Drumond de Andrade, nº 707 B - Centro / Itabira
MG

PREPARO INTESTINAL - RM DA PELVE FEMININA PARA DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE

NA VÉSPERA DO EXAME

- A cliente precisa tomar um comprimido de Dulcolax® às 8 horas e outro às 14 horas.
- Caso estes medicamentos causem cólicas ou dores abdominais, é possível fazer uso de Buscopan® simples, por via oral, na dose de um comprimido ou, então, de 30 gotas e a critério do médico que solicitou o exame.
- Durante todo o dia, é necessário manter uma dieta pobre em resíduos, que respeite as indicações e restrições abaixo relacionadas:

Alimentos permitidos:

- suco de frutas coado, água, chá e café;
- água de coco;
- Gatorade®;
- gelatina sem pedaços de frutas;
- pão francês;
- bolacha água e sal;
- sopa magra coada (sem sólidos) de caldo de carne ou de frango;
- macarrão com molho vermelho ou alho e óleo (sem carne nem queijo ralado);
- purê de batata;
- arroz branco;
- picolé de frutas;
- suspiros.

Alimentos proibidos:

- leite e derivados;
- verduras cruas;
- bagaço de frutas;
- salada de folhas;
- frituras;
- feijões, grão-de-bico, milho, lentilha, ervilha;
- sementes e similares.

NO DIA DO EXAME

- A dieta pobre em resíduos deve ser mantida até o início do jejum, que tem de começar quatro horas antes do exame.
- Como a bexiga precisa estar com pequeno enchimento para a avaliação da pelve, é preciso ficar sem urinar somente na hora que antecede a ressonância.